SANA 2016

BioLS

Agricoltura Biologica: la risposta globale al riscaldamento globale

12.19.2016

Tavola rotonda

Sostenibilità energetica in Agricoltura Biologica

Dr. Paolo Foglia

Res. R&D

Solutions

IN RESPECT OF
PEOPLE
&
NATURE

la sfida globale che
(inevitabilmente)
dobbiamo affrontare

Riuscire a produrre alimenti sufficienti per una popolazione che nel 2050 supererà i 9 miliardi di individui*, nonché biomassa in quantità tale da rispondere alla domanda crescente di sostituti dei prodotti di origine petrolchimica, riuscendo allo stesso tempo a ridurre la pressione ambientale dell'agricoltura.

**Fondo delle Nazioni Unite per la Popolazione, UNFPA.*

criticità

terra (suolo), risorsa scarsa

Superficie mondiale totale:	13,3 miliardi di Ha
Superficie mondiale totale di terra idonea alla coltivazione:	4,4 miliardi di Ha
Superficie totale delle terre coltivate (agric. pluviale + agric. irrigua):	1,6 miliardi di Ha (12%)
Superficie totale delle foreste:	3.7 miliardi di Ha (28%)
Superficie a pascolo e bosco:	4.6 miliardi di Ha (35%)

(FAO, 2011. "The state of the world's land and water resources for food and agriculture")

FIGURE 1.2: EVOLUTION OF LAND UNDER IRRIGATED AND RAINFED CROPPING (1961–2008)

Source: FAO (2010b)

Pressioni sulla disponibilità delle terre

- **Degrado dei suoli.** Associato a fenomeni quali erosione del suolo, perdita di fertilità, deterioramento degli ecosistemi, ecc. In accordo alla FAO (2011):
Superficie di terra soggetta a degrado: **25%**
Superficie di terra moderatamente soggetta a degrado: **8%**
- **Consumo di suolo,** fenomeno associato alla perdita di superficie agricola, naturale o seminaturale, dovuta all'incremento della copertura artificiale legato alle dinamiche insediative e alle infrastrutture. In Italia, il suolo consumato è passato dal 2,7% degli anni '50 al **7,0% stimato per il 2015**. In termini assoluti, si stima che il consumo di suolo abbia interessato circa **21.100 Km²** del territorio (ISPRA, 2016).
- **Competizione per usi alternativi delle terre a costante copertura biofisica della superficie terrestre.** Alcuni usi che competono con la produzione di alimenti sono, ad esempio: biocombustibili (soprattutto di prima generazione); carta; biopolimeri; ecc.

aria, stiamo cambiando il clima

Le emissioni globali dell'agricoltura rappresentano il **10-12%** delle emissioni globali di gas di serra di natura antropica (IPCC)

[Mitigazione]

Il settore agricolo e forestale (AFOLU) è l'unico tra i settori considerati nel rapporto dell'IPCC, il cui potenziale di mitigazione è derivato **sia dalla riduzione delle emissioni** attraverso la gestione del suolo e degli allevamenti, **che dalla rimozione dei gas serra (sequestro).**

Il principale obiettivo dell'AB è il mantenimento di un elevato livello di sostanza organica nei suoli

Lo stock di carbonio in un orizzonte di 25 cm è pari a:

- Agricoltura Bio **37,4 t C/Ha**
- Agricoltura Con **26,7 t C/Ha**

Gattinger A. et al. «Enhanced top soil carbon stocks under organic farming». PNAS 2012;109:18226–31

cosa fare?

Intensificazione ecologica

Incrementare la produttività agricola* attraverso l'adozione di metodi di produzione che:

- intensifichino i benefici effetti delle funzioni dell'agroecosistema, includendo la biodiversità e la fertilità del suolo;
- usino i meccanismi di autoregolazione degli organismi e dei sistemi biologici ed organizzativi;
- chiudano i cicli dei materiali in modo da ridurre le perdite;
- ricerchino la migliore combinazione tra variazione ambientale e la variabilità genetica delle piante e delle colture

**Secondo la FAO, è necessario aumentare la produzione agricola del 60% da qui al 2050.*

Multifunzionalità

L'incremento della produzione agricola, nella visione di una intensificazione ecologica, non può che essere riferirsi ad un sistema olistico che integri una molteplicità di «beni commerciali» e «beni comuni» in cui il tema dell'energia è di fondamentale importanza.

Funzioni

Produzione beni commerciali

Prodotti per alimentazione umana ed animale
Bio-Energia
Bio-Prodotti

Produzione beni comuni

Resilienza
Mitigazione
Paesaggio

Land Use

Agricoltura Biologica e Biogas

The Role of Organic Agriculture in Mitigating Climate Change

- a Scoping Study -

Johannee Kotschli and Karl Müller-Sämann

May 2004

Ecology and Farming

The magazine of the International Federation of Organic Agriculture Movements

No. 44
March 2009 - 5€

Il settore dell'agricoltura biologica ha avviato una riflessione sul biogas nei primi anni del 2000 in relazione al potenziale di mitigazione dell'agricoltura biologica (*IFOAM, 2004*), proseguita poi con la pubblicazione di alcuni lavori su «agricoltura, gestione dell'energia ed emissioni» in preparazione della COP15 di Copenaghen sui Cambiamenti Climatici (*Ecology and Farming, March 2009*).

Questo percorso ha portato nel 2014 ad avviare il progetto «**Sustainable biogas production**» a cui hanno partecipato - oltre ad altri - IFOAM, FiBL e Økologisk Landsforening ovvero l'organizzazione dell'agricoltura biologica della Danimarca.

Integrazione del biogas nell'agricoltura biologica

L'integrazione del biogas in agricoltura biologica è interessante per gli agricoltori perché da essa può derivare:

- una migliore gestione della fertilizzazione soprattutto nelle aziende senza allevamenti;
- un incremento del reddito;
- una maggiore autosufficienza energetica

Ed anche

- Un migliore bilancio delle emissioni di gas climalteranti

Fonte: Tersbøl M., and Malm L. (2013)

Migliore gestione della fertilizzazione (1/2)

La digestione anaerobica permette:

- **Recupero di unità fertilizzanti** – Il digestato prodotto dalla digestione anaerobica è una soluzione organica stabilizzata e contenente un equilibrato mix di macro e micro elementi fertilizzanti in forme prontamente disponibili per la pianta. Il processo di digestione anaerobica, infatti, determina una riduzione della sostanza organica meno stabile, ma non riduce i quantitativi di azoto e fosforo, mentre mineralizza parte dell'azoto organico in azoto ammoniacale (contenuto soprattutto nella frazione liquida).

Il digestore può

- **Stabilizzazione della sostanza organica** – abbattimento del carico organico (70-80% come solidi volatili).

Migliore gestione della fertilizzazione (2/2)

- **Abbattimento delle emissioni** in atmosfera dal reflu di gas climalteranti (CH_4 , N_2O , NH_3);
- **Riduzione dell'impatto odorigeno** dei reflui di allevamento, determinata dalla riduzione della putrescibilità della frazione organica.
- **Riduzione della carica patogena** - la digestione anaerobica in mesofilia può ridurre parzialmente la eventuale carica patogena presente nei liquami. Operando in termofilia è possibile ottenere la completa igienizzazione del liquame con la completa distruzione dei patogeni

Criteri per il biogas in agricoltura biologica (1/2)

Il biogas in agricoltura biologica deve assicurare che:

- Le biomasse avviabili al digestore non competano con la produzione di cibo. A tale scopo, le colture energetiche dedicate impiegate non dovrebbero essere superiori al 20-25% sul peso totale del substrato in termini di materia secca. Al fine di questo calcolo, non deve essere considerata la quota di colture dedicate ottenute da:
 - colture intercalari (secondo raccolto);
 - erbai/prati avvicendati di leguminose;
 - coltivazione di aree aziendali marginali scarsamente utilizzate.

Criteria per il biogas in agricoltura biologica (2/2)

- Sia favorito l'impiego di biomasse residuali quali:
 - effluenti zootecnici; sottoprodotti provenienti da attività agricola;
 - sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano;
 - sottoprodotti provenienti da attività alimentari ed agroindustriali;
 - acque di vegetazione dei frantoi oleari e sanse umide anche denocciolate.

Emissioni di diverse filiere biogas a confronto con mix energetico nazionale ed europeo

F1: solo biomasse, vasca digestato coperta 50%

F2: 70% liquame, 30% biomasse, vasca digestato coperta 50%

F3: solo liquame vasca digestato coperta 50%

F4: solo liquame vasca digestato scoperta

Fonti: ISPRA Rapporto 172/2012; EC, Commission staff working document, 2014

Altri aspetti socio- economici

Incremento del reddito

Da un'indagine condotta in Germania nel 2010 su agricoltori biologici con impianti a biogas o che collaboravano con impianti, è risultato che il 40% ha evidenziato incrementi di produzione del 20-30%, ed un ulteriore 18% ha riscontrato aumenti anche superiori.

Fonte: Anspach V., Siegmeier T., and Möller D. (2010)

Bioenergie Schmiechen

Azienda di circa 80 ettari certificata bio dal 1999.

L'impianto a biogas della potenza di 350 kWe è stato installato nel 2005.

Parte della biomassa è fornita da circa 80n agricoltori biologici locali che non hanno allevamenti e ricevono il digestato come fertilizzante.

L'energia elettrica prodotta annualmente è pari a 2800 MWe/anno è ceduta in rete con una tariffa di 0.22€/kWh per un totale di circa 616.000 €.

La tariffa include un bonus per l'uso dell'energia termica impiegata per l'impianto di essiccazione dei cereali.

Maggiore autosufficienza energetica (1/2)

La trasformazione del biogas in energia avviene, di norma, per combustione in cogeneratori per la produzione combinata di energia elettrica e calore.

In questo caso, l'energia elettrica è vantaggiosamente utilizzata sia per autoconsumo, sia per la cessione incentivata con il meccanismo della Tariffa Omnicomprensiva o dei Certificati Verdi.

Per quanto riguarda l'energia termica, è importante che, oltre all'uso per il riscaldamento del digestore, sia verificata la possibilità di altri impieghi e/o di destinarne almeno una parte ad un ciclo termodinamico per la produzione di una quota aggiuntiva di energia elettrica.

Krumbecker Hof

Azienda biologica e biodinamica attiva dal 1991 con 230 ettari. Dal 2010 ha installato un impianto a biogas di 160 kWel alimentato da un misto di substrati che comprendono anche sottoprodotti di alcuni molini.

L'energia elettrica prodotta viene immessa in rete. L'energia elettrica necessaria per l'impianto è prodotta da turbine eoliche. L'energia termica fornisce calore ed acqua calda alle 10 famiglie che vivono nell'azienda nonché agli altri edifici aziendali e all'essiccatoio per i cereali.

Maggiore autosufficienza energetica (2/2)

BIOMETANO

Diversamente da altre bioenergie, il biogas dopo una purificazione spinta e compressione può raggiungere caratteristiche simili a quelle del gas naturale compresso (CNG), con un contenuto di CH₄ pari al 95%, ed essere quindi immesso in rete o, con la pubblicazione delle procedure del GSE per l'incentivazione della produzione di biometano, essere distribuito extra rete nel settore dei trasporti.